

Lista da fauna do Rio Grande do Sul ameaçada de extinção⁰ pela expansão das áreas com plantios comerciais de árvores exóticas⁰

(por Guilherme Abreu⁰)

Insetos

1- *Monocesta rubiginosa* (Clark, 1865)

Nome popular: Besouro

Ocorrência: São Francisco de Paula

Principais Ameaças: Exploração madeireira, introdução de espécies exóticas, como o pínus e o tojo.

2- *Monoeca xanthopyga* (Harter-Marques, Cunha & Moure, 2001)

Nome popular: Abelha

Ocorrência: Canela, São Francisco de Paula e Cambará do Sul.

Principais Ameaças: Descaracterização da Mata Atlântica. Queimadas, uso de herbicidas e plantações comerciais de árvores exóticas.

Anfíbios

3- *Elachistocleis erythrogaster* (Kwet & Di-Bernardo, 1998)

Nome Popular: Rã-grilo-de-barriga-vermelha

Ocorrência: Cambará do Sul e São Francisco de Paula.

Principais Ameaças: Queimadas e a substituição dos campos nativos por plantações comerciais de pínus.

4- *Melanophryniscus cambaraensis* (Braun & Braun, 1979)

Nome popular: Sapinho-verde-de-barriga-vermelha

Ocorrência: Cambará do Sul (campos)

Principais Ameaças: Queimadas e monoculturas extensivas de pínus.

Répteis

5- *Cnemidophorus vacariensis* (Feltrim & Lema, 2000)

Nome popular: Lagartinho-pintado

Ocorrência: Campos de Cima da Serra, municípios de Vacaria e Bom Jesus.

Principais Ameaças: Descaracterização do habitat, plantações comerciais de árvores exóticas.

Aves

6- *Circus cinereus* (Vieillot, 1816)

Nome popular: Gavião-cinza

Ocorrência: Planície costeira, depressão central do RS.

Principais Ameaças: Descaracterização de paisagens campestres e áreas úmidas; invasão de espécies exóticas.

7- *Geranoaetus melanoleucus* (Vieillot, 1816)

Nome popular: Águia-chilena

Ocorrência: Campos do sul e sudeste do RS.

Principais Ameaças: Perda acelerada de habitat devido à expansão dos plantios de pínus.

8- *Harpyhaliaetus coronatus* (Vieillot, 1817)

Nome popular: Águia-cinzenta

Ocorrência: Campos de Cima da Serra e campos sulinos.

Principais Ameaças: Conversão dos campos nativos em plantações de pínus, que elimina grandes extensões de seu habitat.

9- *Gallinago undulata* (Boddaert, 1783)

Nome popular: Narcejão

Ocorrência: Norte da serra do sudeste, litoral e planalto das araucárias.

Principais Ameaças: Descaracterização do seu habitat devido à expansão de plantações comerciais de árvores exóticas, além da caça, destruição dos alagados e queimadas.

10- *Tyngites subruficollis* (Vieillot, 1819)

Nome popular: Maçarico-acanelado

Ocorrência: Principalmente na depressão central e planície costeira.

Principais Ameaças: Plantações comerciais de árvores exóticas no litoral, e alastramento espontâneo de pínus.

11- Spartonoica maluroides (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)

Nome popular: Boininha

Ocorrência: Planície Costeira.

Principais Ameaças: Queimadas, cultivo de espécies exóticas (pastagens e florestamentos) e urbanização.

12- Limnocitites rectirostris (Gould, 1839)

Nome popular: Junqueiro-de-bico-reto

Ocorrência: Campos de Cima da Serra, nordeste do estado e serra do sudeste.

Principais Ameaças: Pisoteio do gado, construção de açudes e descaracterização do habitat pela expansão das plantações comerciais de pínus.

13- Culicivora caudacuta (Vieillot, 1818)*

Nome popular: Papa-moscas-do-campo

Ocorrência: Fronteira oeste, Alegrete.

Principais Ameaças: Descaracterização do hábitat, queimadas, conversão dos campos naturais em monoculturas de soja e eucalipto.

14- Heteroxolmis dominicana (Vieillot, 1823)

Nome popular: Noivinha-de-rabo-preto

Ocorrência: Regiões nordeste e sul/sudoeste principalmente.

Principais Ameaças: Substituição dos campos por plantações e invasões de pínus, assim como drenagem de banhados.

15- Anthus nattereri (Sclater, 1878)

Nome popular: Caminheiro-grande

Ocorrência: São Francisco de Paula, Cambará do Sul, Bom Jesus e litoral (Lagoa do Peixe e Mostardas).

Principais Ameaças: Transformação dos campos em plantações comerciais de pínus.

16- Cistothorus platensis (Latham, 1790)

Nome popular: Corruíra-do-campo

Ocorrência: região estuarina da Laguna dos Patos

Principais Ameaças: Eliminação das áreas de juncais para o cultivo de pínus no litoral do RS.

17- Sporophila plumbea (Wied-Neuwied, 1830)

Nome popular: Patativa

Ocorrência: Próximo à divisa com Santa Catarina

Principais Ameaças: Expansão de plantações comerciais de árvores exóticas sobre paisagens abertas do Planalto das Araucárias e caça.

18- Sporophila cinnamomea (Lafresnaye, 1839)*

Nome popular: Caboclinho-de-chapéu-cinzento

Ocorrência: Campanha, planalto das Missões e fronteira oeste.

Principais Ameaças: Descaracterização dos campos nativos.

19- *Sporophila hypoxantha* (Cabanis, 1851)*

Nome popular: Caboclinho-de-barriga-vermelho

Ocorrência: Campos de cima da Serra e Sudoeste do estado.

Principais Ameaças: Caça, barragens e expansão de plantações comerciais de árvores exóticas.

20- *Sporophila palustris* (Barrows, 1883)

Nome popular: Caboclinho-de-papo-branco

Ocorrência: Oeste e Litoral sul.

Principais Ameaças: A substituição dos capinzais por plantações comerciais de árvores exóticas afeta suas áreas de reprodução, eliminando os habitats abertos.

21- *Sporophila melanogaster* (Pelzeln, 1870)

Nome popular: Caboclinho-de-barriga-preta

Ocorrência: Campos do planalto no noroeste do RS.

Principais Ameaças: Modificação dos campos e banhados em consequência de drenagens e especialmente plantações comerciais de pinus.

22- *Gubernatrix cristata* (Vieillot, 1817)*

Nome popular: Cardeal-amarelo

Ocorrência: Serra do sudeste, fronteira com o Uruguai até o extremo oeste.

Principais Ameaças: Caça e descaracterização do hábitat aberto.

23- *Xanthopsar flaws* (Gmelin, 1788)

Nome popular: Veste-amarela

Ocorrência: Serra do sudeste, fronteira oeste, planalto médio e Planalto das Araucárias, proximidades de Porto Alegre e margem oeste da Laguna dos Patos.

Principais Ameaças: Drenagem dos banhados e substituição dos campos por plantações e invasão de pinus. Queimadas e sobrepastoreio.

Mamíferos

24- *Crhysocyon brachyurus* (Illiger, 1815)

Nome popular: Lobo-Guará

Ocorrência: Campos de Cima da Serra e fronteira oeste.

Principais Ameaças: Perda e alteração do habitat pelo avanço rápido e descontrolado de espécies exóticas, mais particularmente o pinus, queimadas e caça.

25- *Oncifelis colocolo** (Molina, 1782)

Nome popular: Gato-palheiro

Ocorrência: Depressão central e campanha do sudeste.

Principais Ameaças: Destruição de campos e banhados, queimadas e expansão de plantações comerciais de árvores exóticas.

26- *Ozotoceros bezoarticus* (Linnaeus, 1758)

Nome popular: Veado-campeiro

Ocorrência: Campos de Cima da Serra e pampas.

Principais Ameaças: Avanço das monoculturas, ampliação da área de plantio de pinus no planalto nordeste.

Conclusão:

Temos 250 espécies de animais em processo de extinção no Rio Grande do Sul (não considerando as 11 extintas ou provavelmente extintas). Para 26 destas espécies (cerca de 10% do total), os 'florestamentos' comerciais com árvores exóticas representam uma ameaça real.

Nos textos das espécies marcadas com asterisco, não há referência as plantações comerciais de árvores exóticas como ameaça, porque essa atividade só se tornou uma ameaça real muito recentemente, após a publicação do Livro Vermelho (2003).

Agradecimento especial:

Glaysen Bencke (Fundação Zoobotânica - RS)